

Dermil

INYECTABLE

FÓRMULA: Triamcinolona acetona: 0,6 g. Excipientes c.s.p 100 mL. / **INDICACIONES:** Afecciones cutánea como alergia, dermatitis, pruritos, eczemas, urticaria. Enfermedades respiratorias de origen alérgico. Para todo tipo de proceso inflamatorio osteoarticular, artritis, bursitis, tenosinovitis, miositis, síndrome reumatoideo. **Dosificación:** Vía intramuscular, subcutánea, intraarticular, intrasnovial. Caninos: Vía IM o SC: 0,1 a 0,2 mg./Kg. (0,33 mL. cada 10 kg.). Felinos: Vía IM o SC 0,1 a 0,2 mg./Kg. (0,15 mL. por animal). Infiltraciones: Caninos y felinos 1,2 a 1,8 mg. (0,2 a 0,3 mL.) / **PRESENTACIÓN:** Envase cont. 3 frascos ampolla de 10 mL. c/u.

- Para el tratamiento de alergias, urticarias y dermatitis
- Una sola aplicación, para todo un tratamiento

Antiinflamatorio, Antialérgico
Suspensión acuosa estéril
Para Caninos y Felinos



Dermil

CREMA

FÓRMULA: Betametasona 17 valerato: 0,10g.; Gentamicina sulfato: 0,10g.; Clotrimazole: 1g.; Vitamina A: 0,6g.; Lidocaina: 0,6g.; Clorhexidina digluconato (20%): 5g.; Excipientes c.s.p. 100g. / **INDICACIONES:** Alergia, urticaria, dermatitis de origen alérgico, localizado, eczemas húmedos o secos, afecciones de origen alérgico y otras enfermedades de la piel que requieran tratamiento con corticoides. Como antiinflamatorio y reconstituyente de la piel. / **SUMINISTRO Y DOSIS:** Uso externo, aplicar localmente en cantidad suficiente en la zona afectada, de dos a tres veces por día. Cubrir para evitar el lamido. / **PRESENTACIÓN:** Pote conteniendo 50 gr.

- La fórmula más completa del mercado
- Fácil absorción
- Con el agregado de Vit. A

Analgésico, Antiinflamatorio, Antibiótico,
Antimicótico, Anestésico, Antihistamínico
Para Caninos y Felinos



Dermil

COMPRIMIDOS

FÓRMULA: Triamcinolona: 1,25 mg. Clorfeniramina maleato: 2,1 mg. Vitamina "A": 5000 U.I., Excipientes c.s.p. 1 comprimido. / **INDICACIONES:** Alergia, urticaria, dermatitis de origen alérgico, prurito gral. o localizado, eczema húmedo o seco. Como antiinflamatorio y reconstituyente de la piel. / **SUMINISTRO Y DOSIS:** Vía oral 1 comprimido cada 20 Kg. de peso vivo. / **PRESENTACIÓN:** Envase de 100 y 400 Comp.

- Para el tratamiento de alergias, urticarias y dermatitis
- 1 comprimido cada 20 kg.
- Con Vitamina "A"
- Único del Mercado

Antihistamínico-Antiinflamatorio
Para Caninos y Felinos



Novul

COMPRIMIDOS

FÓRMULA: Clormadinona acetato 2 mg. excipientes c.s.p. 1 comprimido. / **INDICACIONES:** Interrumpir del estro. Posponer el estro, metrorragias, ninfomanías, alteraciones del ciclo ovárico, pseudogestación e hipersexualidad en el macho. Prevención del estro en caninos y felinos hembras, en anestro. / **SUMINISTRO Y DOSIS:** Vía oral. Para interrumpir el estro: 1 comp. cada 5 kg. de peso durante 8-10 días. Para posponer el estro: 1 comprimido cada 10 kg. de peso durante 4 semanas. Ninfomanía, pseudopreñez e hipersexualidad en el macho: 1 comprimido cada 5 kg. de peso según efectos. / **PRESENTACIÓN:** Envase de 100 y 400 comprimidos.

- Para la interrupción del celo como así también para su postergación

Hormonal, Anticonceptivo
Para Caninos y Felinos



Novul

INYECTABLE

FÓRMULA: Medroxiprogesterona acetato 50 mg., excipientes c.s.p. 1 mL. / **INDICACIONES:** Prevención del estro en caninos y felinos hembras, en anestro. / **SUMINISTRO Y DOSIS:** Vía Subcutánea. Caninos y felinos: 1 mL. (50 mg.) por animal, durante el anestro. Repetir cada 5/6 meses. / **PRESENTACIÓN:** Envase conteniendo 12 ampollas de 1 mL. c/u.

- Anticonceptivo inyectable de elección
- Una sola aplicación previene el celo



Hormonal, Anticonceptivo
Para Caninos y Felinos

Doloprofen 100mg.

COMPRIMIDOS

FÓRMULA: Carprofeno 100 mg., Excipientes csp 1 comprimido. / **INDICACIONES:** Antiinflamatorio no esteroide, analgésico y antipirético indicado par el tratamiento del dolor y la inflamación asociada a la osteoartritis canina. / **SUMINISTRO Y DOSIS:** La dosis recomendada es de 2.2 mg./kg cada 12 horas o 4.4 mg./kg cada 24 hs. La duración del tratamiento queda a criterio clínico y de acuerdo a la evolución del cuadro. / **PRESENTACIÓN:** Envase de 60 comprimidos.

- Para el manejo del dolor post operatorio
- Inhibidor selectivo de la COX2
- Rápida respuesta
- Mínima irritación gástrica



CARPROFENO
Antiinflamatorio
no esteroide de uso oral
Para Caninos

Prote-cis articular

COMPRIMIDOS

FÓRMULA: D. Glucosamina: 400 mg.; Condroitin Sulfato: 100 mg.; Selenito de Sodio: 5 mg.; Vit. C: 30 mg.; Vit. E: 50 mg.; Manganeseo Gluconato: 20 mg.; Excipientes c.s.p 1 comp. / **INDICACIONES:** Osteoartritis, artritis primarias y secundarias, espondiloartritis, discopatías, coxartrosis por displasia. Para prevenir los trastornos derivados de la displasia de cadera. Fortalece las estructuras osteoarticulares en animales en crecimiento. Antiartrítico, analgésico articular. Antioxidante. / **SUMINISTRO Y DOSIS:** 1 comp. cada 20 Kg. de peso vivo durante 60 días. O mejor criterio veterinario. / **PRESENTACIÓN:** Envase de 60 comp.

- La fórmula mas completa y mejor balanceada
- No posee contraindicaciones



Regenerador osteoarticular
Condrogénico, Antiartrósico
Para Caninos y Felinos

GRANDES ANIMALES

Aptomectin Fasciolida

SUSPENSIÓN ORAL

FÓRMULA: Ivermectina: 0,2 g.; Triclabendazole: 12 g.; Excipientes c.s.p. 100 mL. / **INDICACIONES:** Para el tratamiento y control de endoparasitosis en ovinos, para combatir nematodos pulmonares, gastrointestinales, (incluyendo estados inhibidos de Ostertagia). Para el tratamiento de la fasciolosis hepática (Saguaepel). / **SUMINISTRO Y DOSIS:** Vía Oral. 1 mL. Cada 10 kg. de peso vivo (200 mcg de Ivermectina por Kg. de peso vivo y 12 mg. de Triclabendazole por Kg. de peso vivo). En caso de infestaciones graves puede repetirse la dosis con un intervalo no menor a 120 días. / **PRESENTACIÓN:** Bidón de 2500 y 5000 mL.

AptoFen

INYECTABLE

FÓRMULA: Oxfendazole 12,5 g. / **INDICACIONES:** Para el tratamiento y control de nematodos gastrointestinales y pulmonares. Ovicida, larvicida y adulticida. Nematodos gastrointestinales: Ostertagia Ostertagi, Trichostrongylus Axei, Trichostrongylus C., Haemonchus Placei, Cooperia O., Oesophagostomum Radatum, Oesophagostomum C. Nematodos pulmonares: Dictyocaulus Viviparus. / **SUMINISTRO Y DOSIS:** Inyectable por Vía SC, delante ó detrás de la paleta. / **DOSIFICACIÓN:** 1 mL. cada 50 kg de peso vivo (2,5 mg./kg p.v.) No inyectar más de 10mL. por punto de aplicación.



Afford



Afford S.A.

Garibaldi 2619, CP (B1836ALH)

Parque Industrial Lomas de Zamora, Llavallol

Prov. de Buenos Aires, República Argentina - Telefax: (54 11) 4231.8155

www.afford.com.ar

Afford Vademecum



PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD
para la salud animal

f afford @afford_lab

Apto

COMPRIMIDOS

FÓRMULA: Albendazole 300 mg., Praziquantel 25 mg., excipientes c.s.p. 1 comprimido. / **INDICACIONES:** Para combatir parasitosis internas producidas por Ancylostomas, Trichuris, Uncinarias, Toxocara, Dipylidium y Taenia spp. / **SUMINISTRO Y DOSIS:** Vía oral, Cachorros y Adultos: 1 comprimido cada 10 Kg. de peso vivo preferentemente en ayunas. En trichuriasis severas repetir la medicación a las 24 horas. En teniasis duplicar la dosis. / **PRESENTACIÓN:** Envase de 40 y 160 Comprimidos.

- **Antiparasitario Interno de amplio espectro**
- **1 comprimido cada 10 kg**
- **Presentación Hospitalaria**

Antiparasitario interno de amplio espectro
Para Caninos y Felinos



Aptomax

COMPRIMIDOS

FÓRMULA: Ricobendazole: 200 mg.; Praziquantel: 50 mg.; Excipientes: c.s.p. 1 Comprimido. / **INDICACIONES:** Para el tratamiento y control de Ancylostomiasis y Uncinariosis canina, Trichuriasis canina, Ascarioidosis canina y Teniasis canina. / **SUMINISTRO Y DOSIS:** Vía oral. 1 comprimido cada 10 kpv. / **PRESENTACIÓN:** Envase de 2, 4 y 6 comprimidos.

- **Único Antiparasitario con Metabolito Activo: Ricobendazole**
- **Ovicida, Larvicida y Adulticida**
- **¡Una sola toma! no se repite a los 15 días**

Antiparasitario interno de amplio espectro
Para Caninos



AptoMax

SOLUCIÓN ORAL

FÓRMULA: Ricobendazole: 3 g.; Excipientes c.s.p. 100 mL. / **INDICACIONES:** Para el tratamiento y control de las parasitosis producidas por Ancylostoma caninum, Toxocara canis, Toxocara cati y Toxocara leonina, Uncinaria stenocephala y trichuris vulpis. / **SUMINISTRO Y DOSIS:** Vía oral. 1 mL. por kpv. En animales con infestaciones severas repetir a las 24 hs. / **PRESENTACIÓN:** Gotero de 15 mL.

- **Único Antiparasitario con Metabolito Activo: Ricobendazole**
- **Único Antiparasitario para cachorros en solución**
- **¡Una sola toma! no se repite a los 15 días**

Antiparasitario interno de amplio espectro
Para Cachorros, Caninos y Felinos



Apto 3D

COMPRIMIDOS

FORMULA: Pirantel Pamoato: 123mg; Oxantel Pamoato: 400mg; Praziquantel: 50mg. / **INDICACIONES:** Por la combinación de las drogas APTO 3D es específico para el tratamiento de las parasitosis intestinales causadas por Nematodos y Cestodos en sus formas adultas y juveniles: Toxocara canis, Toxocaris leonina, Uncinaria sp., Taenia piliformis, Taenia hidatigeda, Taenia teniformis, Dipylidium caninum, Echinococcus granulosus y Trichuris vulpis. / **DO-SIFICACIÓN:** 1 comp. cada 10kg de peso vivo.

- **Antiparasitario interno de una sola toma, gracias a la combinación de sus 3 drogas**
- **Antihelmíntico de amplio espectro para caninos**
- **Protección en 3 dimensiones**

Antiparasitario Interno de amplio espectro
Para Caninos



Apto

POLVO

FÓRMULA: Carbarilo: 5 g., esencias aromatizantes: 1 g., excipientes: c.s.p. 100 g. / **INDICACIONES:** Para el tratamiento de las ectoparasitosis de los pequeños animales, combate piojos y pulgas. / **SUMINISTRO Y DOSIS:** USO EXTERNO. Espolvorear en cantidad suficiente sobre el pelaje del animal froitando a contrapelo, procurando que el polvo tome contacto con la piel, repetir a los 10 días. Las reinfestaciones se evitan espolvoreando las cuchas, mantas y camas. / **PRESENTACIÓN:** Talquera x 150 g.

- **Para el tratamiento de Ectoparásitos**
- **Acción por 10 días**
- **Puede ser utilizado en cuchas y mantas**
- **Único con 150 Grms**

Antiparasitario externo
Para Caninos y Felinos



Fit g

PIPETA

FÓRMULA: Imidacloprid: 10 g.; excipientes c.s.p. 100 mL. / **INDICACIONES:** Antiparasitario externo pulguicida para felinos. / **DOSIFICACIÓN:** Uso externo. Dosis hasta 5 kg.: Aplicar 10 gotas por animal en la nuca o entre los omóplatos, para evitar el lamido, procurando que el producto haga contacto con la piel. Evitar los ojos y la boca del animal. Dosis hasta 10 kg.: Aplicar 1 pipeta por animal en la nuca o entre los omóplatos, para evitar el lamido, procurando que el producto haga contacto con la piel. Evitar los ojos y la boca del animal. / **PRESENTACIÓN:** Estuche conteniendo 1 pipeta.

- **Pipeta hasta 10kg de peso**
- **Efecto Antifeeding**
- **Una dosis protege por 30 días**

Antiparasitario Externo Pulguicida
Para Felinos



Fit f

PIPETA

FÓRMULA: Imidacloprid: 10 g.; Flumetrina: 1 g.; Metopreno: 10 g.; Excipientes c.s.p. 100 mL. / **INDICACIONES:** Antiparasitario externo. Pulguicida, garrapaticida, repelente de moscas y mosquitos para caninos. / **DOSIFICACIÓN:** Uso externo. Aplicar 1 pipeta por animal, de acuerdo a su peso, en la nuca o entre los omóplatos. Evitar los ojos y la boca del animal. Perros hasta 4 Kg.: Pipeta de 0,4 mL. De 4 a 10 Kg.: 1 mL. De 10 a 25 Kg.: 2,5 mL. De 25 a 40 Kg.: 4 mL. De 40 a 60 Kg.: 6 mL. / **PRESENTACIÓN:** Estuche conteniendo 1 pipeta.

- **Única pipeta con efecto ambiental**
- **Efecto Antifeeding**
- **Una dosis protege por más de 30 días**
- **Repelente de moscas y mosquitos**

Pulguicida, garrapaticida, piojicida,
repelente de moscas y mosquitos
Para Caninos



Fit

SOLUCIÓN EMULSIONABLE

FÓRMULA: DDVP dimetil-dicloro-vinil-fostato: 6,6g.; Cipermetrina: 1,5g.; Expientes c.s.p. 100mL. / **INDICACIONES:** Antiparasitario externo. Pulguicida, piojicida y garrapaticida para perros y ambiente. / **DOSIFICACIÓN E INSTRUCCIONES DE USO:** Caninos: Uso externo. Diluir 15 mL. por lt. de agua. Utilizar esta emulsión para enjuagar al animal después del baño. Se aconseja repetir el tratamiento a los 10-12 días. Ambiente: Diluir 15 mL. en 2 lt. de agua. Utilizar la emulsión para balear o rociar el lugar deseado. Repetir, si fuera necesario entre los 10-12 días de aplicado. / **PRESENTACIÓN:** Envase de 120 mL.

- **Para el tratamiento de Ectoparásitos**
- **Acción por 10 días**
- **Puede ser utilizado en cuchas, mantas y jardines**
- **Evita la reinfestación**

Antiparasitario Externo Pulguicida,
Piojicida y Garrapaticida
Para Caninos y Ambiente



fitUp
FIPRONIL + METOPRENO

FÓRMULA: Fipronil: (+)-5-amino-1-(2,6-dicloro- α - α -trifluoro-p-tolil)-4-trifluorometil sulfonilpirazol-3-carbonitrilo: 10g. Metopreno:10 g. Excipientes c.s.p. 100 mL. **INDICACIONES:** Antiparasitario externo, pulguicida para gatos. / **DOSIFICACIÓN:** Uso externo. Aplicar 1 pipeta por animal, en la nuca o entre los homoplatos para evitar el lamido. Gatos: 0,55 mL. / **PRESENTACIÓN:** Estuche conteniendo 1 pipeta.

- **Efecto Ambiental**
- **Contra pulgas**
- **Solución cutánea para administración Spot on**

Antiparasitario Externo
Para Felinos



fitUp
FIPRONIL + METOPRENO

FÓRMULA: Fipronil: (+)-5-amino-1-(2,6-dicloro- α - α -trifluoro-p-tolil)-4-trifluorometil sulfonilpirazol-3-carbonitrilo: 10g. Metopreno:10 g. Excipientes c.s.p. 100 mL. **INDICACIONES:** Antiparasitario externo, pulguicida y garrapaticida para perros. / **DOSIFICACIÓN:** Uso externo. Aplicar 1 pipeta por animal, de acuerdo a su peso, en la nuca o entre los omóplatos. Evitar los ojos y la boca del animal. Perros de 2 a 10 Kg.: Pipeta de 0,7 mL. De 10 a 20 Kg.: 1,4 mL. De 20 a 40 Kg.: 2,7 mL. De 40 a 60 Kg.: 4,1 mL. / **PRESENTACIÓN:** Estuche conteniendo 1 pipeta.

- **Efecto Ambiental**
- **Contra pulgas y garrapatas**
- **Solución cutánea para administración Spot on**

Antiparasitario Externo
Para Caninos



fitUp
FIPRONIL + METOPRENO
SPRAY

FÓRMULA: Fipronil: 0,25 g. Methopreno: 0,25 g.; excipientes c.s.p. 100 mL. / **INDICACIONES:** Antiparasitario externo, pulguicida y garrapaticida para perros. / **DOSIFICACIÓN:** Rociar la totalidad del cuerpo del animal, (no olvidar orejas, barriga, axilas, dedos) abrir el pelo, procurando que el producto haga contacto con la piel. De 3 a 6 mL. (7 a 15 mg. / kg.) pulsar la válvula 7 veces por kg. de peso vivo. Esta válvula provee 0,65 mL por vez. / **PRESENTACIÓN:** fcos de 100 mL.

- **Efecto Ambiental**
- **Contra pulgas y garrapatas**
- **Solución cutánea para administración en rocío.**

Antiparasitario Externo
Para Caninos



fit
COMPRIMIDOS
PALATABLES
MASTICABLES
NUEVO PRODUCTO

FÓRMULA: Spinosad 33%. Excipientes c.s.p. 1 comprimido. / **INDICACIONES:** Antiparasitario externo pulguicida para caninos y felinos. / **SUMINISTRO Y DOSIS:** Vía oral, administrar de 40 a 75 mg/kpv en perros y 50 a 80 mg/kpv en gatos. Se recomienda administrar junto con el alimento o inmediatamente después. / **PRESENTACIÓN:** Gatos: conteniendo 1 blister x 1 comp. 4 a 8kg; conteniendo 1 blister x 1 comp. 9 a 15kg; conteniendo 1 blister x 2 comp. 16 a 22kg; conteniendo 1 blister x 1 comp. y 1 blister de 2 comp. 23 a 41kg; conteniendo 2 blister x 2 comp. y 1 blister de 1 comp.

- **Puede utilizarse como parte de una estrategia terapéutica para el control de la dermatitis alérgica por picadura de pulgas (DAPP).**
- **Comprimidos Palatables y Masticables.**
- **Una dosis protege por 30 días.**

Antiparasitario Externo
Para Caninos



DentalPlax

SOLUCIÓN ORAL

FÓRMULA: Xilitol 0,5 g cada 100 mL. / **INDICACIONES:** Para la higiene bucal de caninos y felinos. Como preventivo de gingivitis, caries y otras infecciones bucales, generadoras de placa dental bacteriana y de la formación de sarro. Combate el mal aliento (halitosis). / **SUMINISTRO Y DOSIS:** Como única fuente de bebida a razón de 10 mL cada 1 litro de agua. Se suministra el agua durante todo el día, pasadas las 24 hs., se debe tirar el agua sobrante y se cambia por una solución nueva. / **PRESENTACIÓN:** Envase de 250 mL.

- **Antibacteriano**
- **Anti placa**
- **Anti sarro**

Antiséptico Bucal
Para Caninos y Felinos



Cefal

COMPRIMIDOS

FÓRMULA: Cefalexina: 500 mg.; Excipientes: c.s.p. 1 comprimido. / **INDICACIONES:** Para combatir enfermedades infectocontagiosas producidas por gérmenes Gram positivos y Gram negativos, sensibles a la cefalexina. Especifico para el tratamiento de infecciones de la piel, tejidos blandos, osteoarticulares, gastrointestinales, oído medio, vías respiratorias o genitourinarias. / **SUMINISTRO DE DOSIS:** Vía oral. 25-30 mg. por Kg. de peso vivo, cada 8-12 hs. Por un periodo no menor a 7 días. En infecciones rebeldes (piel) puede suministrarse por un lapso mayor a 30 días. / **PRESENTACIÓN:** Envase de 80 comprimidos.

- **Antibiótico de Amplio Espectro**
- **1 comprimido cada 20 kg.**

Antibiótico de Amplio Espectro
Para Caninos y Felinos



Doxi100-200

COMPRIMIDOS

FÓRMULA: Doxiciclina (como hidrato) 100 y 200 mg., Excipientes c.s.p. 1 comprimido. / **INDICACIONES:** Antibiótico para Caninos y Felinos. Bacteriostático, siendo efectivo contra Gérmenes Gram (+); Gram (-); Anaerobios. Ehrlichiosis, Leptospirosis, Brucelosis, Bartonellosis, Micoplasmosis, Chlamydia, Anaplasmosis, Babesiosis y Cytauxzoonosis. / **SUMINISTRO Y DOSIS:** Vía oral, 5 a 10mg/kpv cada 12 o 24 hrs según criterio profesional. **PRESENTACIÓN:** Envase de 100 comprimidos.

- **Mayor liposolubilidad.**
- **Atraviesa la barrera hematoencefálica (BHE).**
- **Es excretada por las heces, pudiendo utilizarse en animales que presentan insuficiencia renal.**

Antibiótico
Para Caninos y Felinos

NUEVO PRODUCTO



Floxacin 50mg.

COMPRIMIDOS

FÓRMULA: Enrofloxacin: 50 mg.; Excipientes: c.s.p. 1 comp. / **INDICACIONES:** Por su efectividad antimicrobiana sobre Piodermitis (Pseudomona Aeruginosa), Neumonías (Pseudomonas, Klebsiella, Serratia), Enteritis (E. Coli, Salmonellas), Nefritis (Proteus, Stafilococcus, E. Coli) y Otitis (Pseudomonas, etc.) resulta una medicación de elección en el tratamiento de estas afecciones que suelen ser muy severas y recurrentes. / **SUMINISTRO Y DOSIS:** Vía oral, 1 comprimido (50mg.) cada 10 k.p.v. cada 24 horas durante 10 días. **PRESENTACIÓN:** Envase de 100 comprimidos.

- **Larga Acción**
- **1 toma cada 24hs**
- **Comprimidos ranurados**

Quimioterápico de amplio espectro
Para Caninos y Felinos



Floxacin 100mg.

COMPRIMIDOS

FÓRMULA: Enrofloxacin: 100 mg.; Excipientes: c.s.p. 1 comp. / **INDICACIONES:** Quimioterápico de amplio espectro y larga acción. Por su efectividad antimicrobiana sobre Piodermitis (Pseudomona Aeruginosa), Neumonías (Pseudomonas, Klebsiella, Serratia), Enteritis (E. Coli, Salmonellas), Nefritis (proteus, Stafilococcus, E. Coli) y Otitis (Pseudomonas, etc.) resulta una medicación de elección en el tratamiento de estas afecciones que suelen ser muy severas y recurrentes. / **SUMINISTRO Y DOSIS:** Vía oral, 1 comprimido (100mg.) cada 20 kgs. de peso vivo cada 24 horas durante 10 días. / **PRESENTACIÓN:** Envase de 100 comprimidos.

- **Larga Acción**
- **1 toma cada 24hs**
- **Comprimidos ranurados**

Quimioterápico de amplio espectro
Para Caninos y Felinos



Floxacin

SOLUCIÓN INYECTABLE

FÓRMULA: Enrofloxacin 5 g.; Excipientes c.s.p. 100 mL. / **INDICACIONES:** Para el tratamiento de enfermedades infectocontagiosas producidas por gérmenes Gram positivos y Gram negativos. Especifico para el tratamiento de infecciones severas, crónicas o rebeldes a otras medicaciones antibióticas, como piodermitis, infecciones recurrentes del aparato urogenital, otitis infecciosa e infecciones secundarias a procesos virales. / **SUMINISTRO Y DOSIS:** Vía subcutánea o intramuscular: 1 mL. (50 mg.) cada 10 kgs. de peso, cada 24 hs. / **PRESENTACIÓN:** Envase conteniendo 3 frascos ampolla de 25 mL. c/u; Frasco de 500 mL.

- **Larga Acción**
- **De uso subcutáneo o Intramuscular**

ENROFLOXACINA
Quimioterápico de amplio espectro
Para Equinos, Bovinos, Ovinos,
Porcinos, Caninos y Felinos



Floxacin

ÓTICO

FÓRMULA: Enrofloxacin 2,5 g., Lidocaina clorhidrato 2 g., Clotrimazole 1 g., Excipientes c.s.p.100 mL. / **INDICACIONES:** Por su efectividad antimicrobiana sobre las Otitis, resulta una medicación de elección en el tratamiento de estas afecciones que suelen ser muy severas y recurrentes. / **SUMINISTRO Y DOSIS:** Uso externo. Limpiar prolijamente el conducto auditivo externo, limbrándolo de exudados, pus y restos celulares. Luego aplicar profundamente con la jeringa 0,5 mL. Estirar la oreja levemente hacia arriba para facilitar la penetración del producto. Repetir una vez por día hasta la remisión de los síntomas. / **PRESENTACIÓN:** Envase conteniendo 3 jeringas dosificadoras de 10 mL cada una.

- **Bactericida**
- **Fungicida**
- **Jeringa con cánula que permite llegar al problema**

Quimioterápico de amplio espectro
Anestésico local
Para Caninos y Felinos



Hemocarb

INYECTABLE

FÓRMULA: Dipropionato de Imidocarb 12 g. Excipientes c.s.p. 100 mL. / **INDICACIONES:** En Caninos: Hemoparasitocida y quimioterápico inyectable. En Bovinos: Hemoparasitocida y quimioterápico inyectable. / **SUMINISTRO Y DOSIS:** Caninos: 6 mg/kpv lo cual representa 0,5 ml/10Kg, idealmente diluido en solución fisiológica y por vía subcutánea. Se recomienda administrar atropina, antes del Imidocarb, a dosis de 0,025mg/Kg. Entre cada aplicación, debe transcurrir no menos de 14 días. Bovinos: Las dosis difieren según la enfermedad a controlar y la vía de administración subcutánea. Babesiosis: 1 ml cada 100 kpv. Anaplasmosis: 2,5 mL cada 100 kpv. / **PRESENTACIÓN:** Frasco ampolla de 20 y 100 mL.

- **Recomendado para el control y tratamiento de la Erlichiosis canina**
- **Recomendado para el control y tratamiento de la babesiosis y anaplasmosis en bovinos.**

Hemoparasitocida y
quimioterápico inyectable
Para Caninos y Bovinos



RifasolTop

SPRAY

FÓRMULA: Rifamicina sódica: 1g. / **INDICACIONES:** Para el tratamiento de enfermedades infectocontagiosas producidas por gérmenes Gram positivos y Gram negativos sensibles a su espectro. Aplicar sobre heridas, úlceras, forúnculos, quemaduras; piodermitis superficiales y profundas concomitante con la terapia parenteral. Dermatitis por lamido. / **SUMINISTRO Y DOSIS: CANINOS Y FELINOS:** 3 a 4 aplicaciones diarias. Se emplea localmente para lavados o para instilar en cavidades. Rociar la zona afectada, 3 o 4 veces por día, colocar vendas o apósitos para evitar el lamido. / **PRESENTACIÓN:** Frasco con válvula dosificadora, conteniendo 30 mL.

- **Para uso Intracavitario**
- **Único del Mercado**
- **Práctica presentación en Spray**

Solución acuosa para uso tópico
Antibiótico bactericida
Para Caninos y Felinos



Tribiotic-LA

INYECTABLE

FÓRMULA: Benzilpenicilina procaína: 10.000.000.U.I.; Benzilpenicilina benzatina: 10.000.000.U.I.; Dihidrotreptomicina: 20g. / **INDICACIONES:** Para el tratamiento de enfermedades infectocontagiosas producidas por gérmenes Gram (+) y Gram (-) sensibles a la penicilina y a la estreptomocina. / **SUMINISTRO Y DOSIS:** Vía IM o SC, como dosis general: Bovinos y Equinos: 10 mL. cada 100 kg. Terneros, potrillos, porcinos, ovinos, caprinos y caninos gdes: 1-2 mL. cada 25 kg. Porcinos grandes: 5 mL. cada 50 kg. Caninos: 1 mL. por animal. Felinos: 0,5 mL. por animal. Habitualmente, basta con sólo 1 aplicación, si fuera necesario, repetir a las 72 horas. En gatos se recomienda la Vía SC. / **PRESENTACIÓN:** Frasco Ampolla de 25 y 100 mL.

- **Listo para usar**
- **La penicilina más confiable**

Suspensión acuosa estéril
Antibiótico de amplio espectro
Para Equinos, Bovinos, Ovinos,
Porcinos, Caprinos, Caninos y Felinos



Dexa400

INYECTABLE

FÓRMULA: Dexametasona 21 fosfato disódico: 0,4 g. / **INDICACIONES:** Antiinflamatorio esteroide, gluconeogénico y antialérgico de rápida acción. Está indicado para afecciones cutáneas como alergia, dermatitis, pruritos, eczemas, urticaria. Enfermedades respiratorias de origen alérgico. Para todo tipo de proceso inflamatorio osteoarticular, artritis, bursitis, tenosinovitis, miositis, síndrome reumatoideo y otras enfermedades que requieran tratamiento con glucocorticoides. / **SUMINISTRO Y DOSIS:** Caninos y felinos: de 0,025 a 0,2 mg./kpv (0,25 a 2 mg./10 Kg.) (0,0625 a 0,5 mL./10 Kg.). Se recomienda, aplicar de 1 a 3 veces por día, de acuerdo a las distintas patologías y /o según criterio profesional. / **PRESENTACIÓN:** Frasco ampolla cont. 25 mL.

- **Acción ultra rápida**
- **Aplicación subcutánea, endovenosa e intramuscular**

Solución acuosa Inyectable
Antiinflamatorio Glucocorticoide
de alta concentración
y efecto ultra rápido
Para Equinos, Bovinos, Ovinos,
Porcinos, Caprinos,
Caninos y Felinos



Dexa 2000

SHOCK INYECTABLE

FÓRMULA: Dexametasona 21 fosfato disódico: 2 g. / **INDICACIONES:** Para la terapéutica de emergencia de diversos estados de shock, anafilaxia, bronco espasmo, traumatismos craneo-encefálicos, síndrome de compresión medular, raquialgias, neuralgias y neuropatías, artropatías, mialgias y miopatías, tendinitis, bursitis, enfermedades autoinmunes, stress, síndrome anoréxico y azotemia del animal de deporte. Se podrá utilizar en alergias dermatológicas o respiratorias, asma bronquial, cetosis y como agente inductor del parto. / **SUMINISTRO Y DOSIS:** Caninos y felinos: En shock: 5 mg./kg. (0,25 mL./kpv.). Vía EV. Repetir a las 3 o 6 hs. Ovinos, caprinos y porcinos: En shock 3 mg./kpv. (0,15 mL./kpv.) Vía EV. Repetir a las 3 o 6 hs. Bovinos y Equinos: En shock: 3 a 6 mg./kpv. (0,15 a 0,30 mL./kpv.) Vía EV. Repetir a las 3 o 6 hs. / **PRESENTACIÓN:** Frasco ampolla cont. 25 mL.

- **Para uso en emergencias**
- **De uso subcutáneo, intramuscular y endovenoso**

Solución acuosa Inyectable.
Antiinflamatorio Glucocorticoide
de alta concentración y efecto ultra rápido
Para Equinos, Bovinos, Ovinos,
Porcinos, Caprinos,
Caninos y Felinos

